Рекомендации после лечения кариеса

1. Постарайтесь не жевать на той стороне, где проводилось лечение до того момента, пока не пройдет онемение после анестезии(обезболивания), чтобы не прикусить нечувствительные мягкие ткани губ, щеки, языка. На верхней челюсти онемение может длиться в течение 1-2 часов, на нижней челюсти значительно дольше в течение 2 -4 часов, в зависимости от ваших анатомических особенностей;

2. После прекращения действия анестезии пломба может мешать по прикусу, так как во время подгонки по прикусу Вы были под действием анестезии и не могли до конца её чувствовать. Мы рекомендуем записаться на коррекцию пломбы для восстановления комфорта, это займёт не более 10 минут;

3. Пролеченный зуб может реагировать на температурные раздражители в течение 2х недель. Если зуб реагирует более 2х недель, рекомендуем обратиться к лечащему врачу – возможно, воспаление затронуло пульпу (нерв) зуба и необходимо лечение пульпита;

4. Возможна травматизация десны клампом и матрицами, которые могут устанавливать под десну. После постановки пломбы, её обязательно полируют, что также может травмировать десневой край. Мы рекомендуем: почистить зубы, прополоскать рот водой и смазывать десну возле зуба гелем «Актовегин» для слизистых оболочек в течение 3 дней после каждого приёма пищи.

Рекомендации предоставлены медицинским работником

ООО «ЯСТОМ»

_____ Дата: _____

С рекомендациями ознакомлен/а и обязуюсь им следовать

Пациент _____ Дата:_____