Рекомендации родителям, после лечения молочного зуба ребенка

1. Если лечение проводилось впервые или Ваш ребенок еще слишком мал, чтобы контролировать свои действия, проследите, чтобы он не кусал щеки, губы и язык пока не прекратится действие анестезии (действие анестетика заканчивается примерно через 1-3 часа после лечения).

2. Если зуб был сильно разрушен, то после лечения десна может быть отечна и гиперемирована (красного цвета) – это проходит в первые несколько дней.

3. В первые 2-3 дня после лечения может быть послеоперационная чувствительность. Если Ваш ребенок жалуется на боль, то необходимо дать болеутоляющее, которое подходит по возрасту и не вызывает аллергии (например, сироп «Нурофен»). В случае если послеоперационная боль не проходит, обратитесь к вашему врачу.

4. Если ребенок все-таки накусал губы или щеку после лечения, то во рту Вы можете увидеть рану, она отечна, гиперемирована (красного цвета) и покрыта белым налетом, в этом случае нужно обработать раствором «Мирамистин» и покрыть гелем «Актовегин». При необходимости обратитесь к вашему врачу.

Рекомендации предоставлены медицинским работником ООО «ЯСТОМ»

_____ Дата: _____

С рекомендациями ознакомлен/а и обязуюсь им следовать

Пациент _____ Дата:_____